






















Age/Visit	Vaccine Recommendation
Birth	Engerix Ped IM
2 months	Pediarix (DTaP, IPV, Hep B) IM
	Hiberix (Hib) IM 
	Prevnar 20 (Pneumococcal) IM 
	Rotarix oral
4 months	Pediarix (DTaP, IPV, Hep B) IM
	Hiberix (Hib) IM 
	Prevnar 20 (Pneumococcal) IM 
	Rotarix oral
6 months	Pediarix (DTaP, IPV, Hep B) IM
	Hiberix (Hib) IM 
	Prevnar 20 (Pneumococcal) IM 
12 months	Havrix (Hep A) IM
	Prevnar 20 (Pneumococcal) IM 
	Priorix/MMR  
15 months	Hiberix (Hib) IM 
	Varivax (chicken pox) SQ  
18 months	Havrix (Hep A) IM
	Infanrix (DTaP) IM
4–6 years	Kinrix (DTaP, IPV) IM
	ProQuad SQ  
11–12 years	Menveo (Men A,C,Y,W) IM
	Boostrix (Tdap) IM
	Gardasil (HPV) 9–26 yrs. IM
16 years	Bexsero (Meningococcal B) IM
	Menveo (Men A,C,Y,W) IM
16 years + 28 days	Bexsero (Meningococcal B) IM
19–64 years	Boostrix (Tdap) IM
	OR Tenivac (Td) IM
50–64 years	Shingrix (Shingles) IM 
65 + years	Boostrix (Tdap) IM
	OR Tenivac (Td) IM
	Prevnar 20 (Pneumococcal) IM 

**Need more info?** Go to CDC's PneumoRec VaxAdvisor

Shake  Shake, do NOT invert  Mix vial and syringe   
 Mix two vials  In freezer 



LAST UPDATED: **01/31/2024**

